

警惕性病



学习目标

- ☑了解性病的传播途径；
- ☑了解青少年容易感染的几种性病；
- ☑掌握性病的预防方法。



性病是一种严重危害人类身体健康的传染性疾病。有些性病，目前医学还没有特效药能将其完全治愈。所以，了解性病知识，预防性病的发生是非常重要的。





思考

关于性病，我们需要知道什么？
性病的传播途径有哪些？



一、性病的传播途径



性传播疾病简称性病。1976年，世界卫生组织将凡是以性接触为主要传播方式的传染性疾病统一称为“性传播疾病”。



直接
接触
传染

间接
接触
传染


母婴
垂直
传染

性病主要的传播途径



直接接触传染

多数性病患者是通过直接的性接触传染的。性病的病原体进入人的体内就会引起感染。



间接接触传染

健康人如果间接接触
被病菌污染过的物品
也有可能被传染。



母婴垂直传染

患有性病的妇女在妊娠或分娩过程中将性病病原体传给胎儿或新生儿。



议一议

这件事可能吗？

同学A：性病传染好厉害呀！我昨天看了几张不雅图片，今天眼皮就长疮了！

同学B：哦，太可怕了！



同学A真的得性病了吗？为什么？



梅毒的传播

关于梅毒的起源和传播有很多说法。其中一种说法认为，梅毒最初出现于美洲。1492年，航海家哥伦布的水手们从美洲把梅毒带回了西班牙，一年后又传播至法国、德国和瑞士等欧洲国家。西班牙人和葡萄牙人又把梅毒传播到了亚洲。1498年，梅毒出现于印度，1505年，梅毒由印度传入中国广东岭南一带，当时被称为“广东疮”、“杨梅疮”，此后梅毒逐渐向中国内地传播。新中国成立后，中国政府采取了封闭妓院、取缔妓女等措施，有效控制了梅毒等性病的流行。可是近几年，梅毒在中国大陆又死灰复燃，而且迅速蔓延。



二、青少年常见性病



青少年容易感染的几种性病

毛滴虫病：这是最常见、传播最广的生殖器感染性病。

女性患病的症状：

痒疹，分泌黄白色泡沫状的白带，阴道口、阴唇红肿。

治疗方法：

口服或局部使用抗滴虫药。

男性患病的症状：

排尿时有灼痛感。

治疗方法：

使用相应的药片。应常仔细清洗阴茎。



霉菌感染：女性比较容易受感染，如霉菌性阴道炎。感染这种病原体的危险不仅存在于性传播中，而且也存在于如厕、桑拿和游泳时。

女性患病的症状：

白带有难闻的气味，带有豆渣状固体物，阴部干燥红肿，有强烈瘙痒感，排尿时有刺痛感。

治疗方法：

口服抗真菌类药物或使用抗真菌软膏、阴道药栓。

男性患病的症状：

男性的症状比女性缓和得多，只是龟头有轻微红肿，排尿时有轻微灼痛感。

治疗方法：

可以使用抗真菌软膏涂抹阴茎。



女性可以采取下列措施预防毛滴虫病和霉菌感染

每天用清水清洗阴部，不用所谓的洗浴产品。

用手清洗下体，不用毛巾，因为毛巾中细菌很多。

游泳后应立即脱下泳衣，净水冲洗后换上干衣服。不要一直穿着湿泳装，因为在潮湿环境中细菌和霉菌容易繁殖。

尽量穿棉质内裤，不要过多使用内裤衬垫，尽量少穿尼龙内裤。



案例

尚红委员：我国青少年网约性行为激增 性病、艾滋病传播扩大亟待关注

“青少年健康成长关乎国家前途命运。但近年我国青少年使用社交网络工具发生偶遇型性行为激增，这种‘网约性行为’伴发多性伴、性病艾滋病传播，危害极大，亟待引起国家有关部门高度关注。”全国政协委员、中国医科大学附属第一医院院长尚红多年来持续关注相关问题，她的提案以政府相关部门应该发挥的作用入手，希望能采取一些切实有效措施防控青少年网约性行为。

尚红委员表示，据国家艾滋病疫情报告系统统计，近年我国每年小于15岁经男男同性性行为途径感染艾滋病毒人数逐年增加。追踪调查发现，这些未成年人感染者都是通过网络途径被诱骗进而被感染。由于艾滋病毒感染后无症状，且确诊发现严重滞后，实际感染人数要远远超过报告感染人数。

来源：国际在线





讨论

同学们，了解了性病的传播途径，你们知道如何预防性病了吗？



三、性病的预防



你知道吗

据医学统计，90%以上的性病传播源于不洁性行为。所以预防性病，首先就要求我们要遵守国家的法律法规及社会的道德规范，避免婚前性行为，洁身自好。



性病是人类健康的大敌，轻者带来性功能障碍，重者导致身体的脏器发生病变，带来终身残疾，造成精神上的极大痛苦和经济上的沉重负担。

你的病症属于感染初期，可以很快治愈。



青少年感染性病之后，一定要重视，不要因为害羞而不愿看医生，使得病情一步步加重，既使自己受到病痛的折磨，也给治愈增加了难度。



找一找

曾经当过医生的李阿姨，她家的保健箱里有五种“药品”可以预防性病，请你查查，你家的药箱有没有这几种“药品”。如果缺乏，请务必备齐。如果比她家多，不妨介绍给大家，资源共享，共保健康。






一瓶保心丸

洁身自爱，抵制“黄色”公害



一瓶消毒水

做好衣裤、浴巾、浴盆等卫生用品与器具的消毒



一盒防毒素

控制性冲动，不发生性行为



一支镇静剂

染上性病要镇静，应去正规医院治疗



一颗防腐丹

不与性病患者发生性接触



关于性病知识，有的家长也了解不多，请将教材中本课的内容分享给他们。



同学们，
今天所学的内容都记住了吗？





随堂测评

1. 女性要预防毛滴虫病和霉菌感染，下列做法正确的是：

- A. 用普通肥皂、清洗液清洗阴部
- B. 用毛巾清洗下体
- C. 用清水清洗下体

2. 关于性病的传播途径，下列说法正确的是：

- A. 性病主要通过性接触传染
- B. 健康人接触性病病人用过的物品，不会传染性病
- C. 性病只传染大人，不会传染婴儿

3. 患有性病的妇女在妊娠或分娩过程中，将性病病原体传给胎儿或新生儿，这种传播途径称之为：

- A. 直接接触传染
- B. 间接接触传染
- C. 母婴垂直传染

参考答案：1.C 2.A 3.C





随堂测评

4. 关于性病，下列说法正确的是：

- A. 性病只能预防，不能治疗
- B. 梅毒、淋病、艾滋病都属于性病
- C. 得性病的人都是没有道德的

5. 毛滴虫病的病原体可以通过哪些途径进行传播？（多选）

- A. 性行为
- B. 不干净的毛巾
- C. 共用洗澡水
- D. 受污染的马桶

参考答案： 4.B 5.ABCD



谢谢观看

